

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2002 года N 12

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02"
(с изменениями на 28 июня 2010 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 февраля 2010 года N 11 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 14, 05.04.2010) (введено в действие с 1 мая 2010 года);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2010 года N 75 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 35, 30.08.2010).

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 **,

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

постановляю:

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 года, с 1 июля 2002 года.

Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
26 апреля 2002 года,
регистрационный N 3415

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации - первый
заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.Онищенко
15 марта 2002 года

Дата введения: с 1 июля 2002 года

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.4.1116-02

(с изменениями на 28 июня 2010 года)

В документе учтены:

[Изменение N 1 от 25 февраля 2010 года](#) (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 февраля 2010 года N 11) (введено в действие с 1 мая 2010 года);

[Изменение N 2 от 28 июня 2010 года](#) (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2010 года N 75).

I. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (далее - санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в емкости: бутылки, контейнеры, пакеты (далее - расфасованных вод), предназначенной для питьевых целей и приготовления пищи, а также требования к организации контроля ее качества.

1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - изготовителями), деятельность которых связана с разработкой, производством, испытаниями и реализацией расфасованных вод, а также для организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.3. Настоящие санитарные правила не распространяются на минеральные воды (лечебные, лечебно-столовые, столовые).

II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила имеют целью обеспечить население высококачественной и оптимальной по содержанию биогенных элементов расфасованной водой для укрепления здоровья и предотвратить появление в торговой сети и специальных службах жизнеобеспечения (при чрезвычайных ситуациях) некачественных расфасованных вод, потребление которых может привести к нарушению здоровья населения.

2.2. Требования настоящих санитарных правил должны соблюдаться при разработке государственных стандартов, технических условий, проектной и технико-технологической документации, инструктивно-методических материалов, рекламной и другой сопроводительной информации, регламентирующей, характеризующей и определяющей качество расфасованных вод, процессы ее производства, хранения, транспортировки, а также при строительстве, реконструкции и эксплуатации предприятий по производству расфасованных вод.

2.3. Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разрешается только при наличии:

- санитарно-эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию;
- нормативной документации на готовую продукцию (технические условия);
- утвержденного технологического регламента (или инструкции);
- рабочей программы контроля качества производимой воды, согласованной с

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года) *Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02* территориальным центром госсанэпиднадзора.

2.4. Качество воды, подлежащей розливу, должно соответствовать гигиеническим нормативам, изложенным в настоящем СанПиНе. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. При наличии в воде веществ, на которые не установлены нормативы, изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить проведение работ по обоснованию ПДК и методов их контроля.

2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу.

2.6. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности УФ-облучение.

2.7. Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии проводят в строгом соответствии с производственно-технологическим регламентом (технологическим описанием, технологической инструкцией), который учитывает гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.

2.8. Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.

2.9. Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации (далее - НД) на готовую продукцию.

2.10. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

2.11. Решение о запрещении или ограничении использования населением расфасованной воды принимается по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска ее потребления для здоровья населения.

2.12. Информация о приостановлении действия санитарно-эпидемиологического заключения на расфасованную воду или его отмене доводится центрами госсанэпиднадзора до сведения изготовителя, потребителей, Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России в течение не более 10 дней с момента принятия решения.

2.13. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются изготовителями, деятельность которых связана с производством расфасованных вод. Изготовители обязаны своевременно осуществлять производственный контроль.

III. Классификация категорий качества питьевых вод, расфасованных в емкости

3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют на:

- артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;

- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.

3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:

- очищенную или доочищенную из водопроводной сети;

- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно необходимыми макро- и микроэлементами).

3.3. В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:

- первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения), безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;

- высшая категория - вода, безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоисточников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения). При сохранении всех критериев для воды 1-й категории питьевая вода оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей.

IV. Гигиенические требования и нормативы качества питьевых вод, расфасованных в емкости

4.1. Настоящими санитарными правилами установлены гигиенические нормативы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества ([таблица 1, п. I б](#)).

4.2. Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле.

4.3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в [таблице 1](#), а также нормативам содержания основных солевых компонентов, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в [таблицах 1 \(п. I б\)](#) и [2 \(п. II а\)](#).

Таблица 1

Показатели	Единицы измерения	Нормативы качества расфасованных питьевых вод, не более		Показатель вредности**	Класс опасности
		Первая категория	Высшая категория		
I. КРИТЕРИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ:					
I а. Органолептические показатели:					
Запах при 20°C	баллы	0	0	орг.	-
При нагревании до 60°C		1	0		
Привкус	"-"	0	0	орг.	-
Цветность	градусы	5	5	орг.	-
Мутность	ЕМФ	1,0	0,5	орг.	-
Водородный показатель (рН), в пределах	единицы	6,5-8,5	6,5-8,5	орг.	-
I б. Показатели солевого состава*:					

Хлориды	мг/л	250	150	орг.	4
Сульфаты	"-	250	150	орг.	4
Фосфаты (PO ₄)	"-	3,5	3,5	орг.	3

Примечание:

* - Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды;

** - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

4.3.1. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.

4.4. Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

4.4.1. Содержанию основных солевых компонентов ([таблица 2, п. II а](#)).

4.4.2. Содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности ([таблица 2, п. II б](#)).

4.4.3. Содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов ([таблица 2, п. II в, г](#)).

4.4.4. Содержанию органических веществ антропогенного и природного происхождения по обобщенным и отдельным показателям ([таблица 2, п. II д](#)).

4.4.5. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивидуально для каждого вод источника в соответствии с действующими санитарными правилами.

Таблица 2

Показатели	Единицы измерения	Нормативы качества расфасованных питьевых вод, не более		Показатель вредности ¹	Класс опасности
		Первая категория	Высшая категория		
1		2		3	4
II. КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА: II а. Показатели солевого и газового состава**:					
Силикаты (по Si)	мг/л	10	10	с.-т.	2
Нитраты (по NO ₃)	"-	20	5	орг.	3
Цианиды (по CN ⁻)	"-	0,035	0,035	с.-т.	2
Сероводород (H ₂ S)	"-	0,003	0,003	орг. зап.	4
II б. Токсичные металлы:					
Алюминий (Al)	мг/л	0,2	0,1	с.-т.	2
Барий (Ba)	"-	0,7	0,1	"-	2

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02

Бериллий (Be)	-"	0,0002	0,0002	-"	1
Железо (Fe, суммарно)	-"	0,3	0,3	орг.	3
Кадмий (Cd, суммарно)	-"	0,001	0,001	с.-т.	2
Кобальт (Co)	-"	0,1	0,1	с.-т.	2
Литий (Li)	-"	0,03	0,03	с.-т.	9
Марганец (Mn)	-"	0,05	0,05	орг.	3
Медь (Cu, суммарно)	-"	1	1	-"	3
Молибден (Mo, суммарно)	-"	0,07	0,07	с.-т.	2
Натрий (Na)	-"	200	20	с.-т.	2
Никель (Ni, суммарно)	-"	0,02	0,02	с.-т.	3
Ртуть (Hg, суммарно)	-"	0,0005	0,0002	-"	1
Селен (Se)	-"	0,01	0,01	-"	2
Серебро (Ag)	-"	0,025	0,025	с.-т.	3
Свинец (Pb, суммарно)	-"	0,01	0,005	с.-т.	2
Стронций (Sr ²⁺)	-"	7	7	-"	2
Сурьма (Sb)	-"	0,005	0,005	с.-т.	2
Хром (Cr ⁺⁶)	-"	0,05	0,03	с.-т.	3
Цинк (Zn ²⁺)	-"	5	3	орг.	3
II в. Токсичные неметаллические элементы:					
Бор (B)	мг/л	0,5	0,3	с.-т.	2
Мышьяк (As)	-"	0,01	0,006	-"	2
Озон ²	-"	0,1	0,1	орг.	3
II г. Галогены:					
Бромид-ион	мг/л	0,2	0,1	с.-т.	2
Хлор остаточный связанный	-"	0,1	0,1	орг.	3
Хлор остаточный свободный	-"	0,05	0,05	орг.	3
II д. Показатели органического загрязнения:					
Окисляемость перманганатная	мг O ₂ /л	3	2	-	-
Аммиак и аммоний-ион	-"	0,1	0,05		
Нитриты (по NO ₂)	-"	0,5	0,005	орг.	2

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года) *Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02*

Органический углерод	мг/л	10	5	-	-
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	"-	0,05	0,05	орг.	-
Нефтепродукты	"-	0,05	0,01	орг.	-
Фенолы летучие (суммарно)	мкг/л	0,5	0,5	орг.зап.	4
Хлороформ	"-	60 ²	1	с.-т.	2
Бромформ	"-	20	1	с.-т.	2
Дибромхлорметан	"-	10	1	с.-т.	2
Бромдихлорметан	"-	10	1	с.-т.	2
Четыреххлористый углерод	"-	2	1	с.-т.	2
Формальдегид	мкг/л	25	25	с.-т.	2
(показатель в редакции Изменения N 2 от 28 июня 2010 года - см. предыдущую редакцию .)					
Бенз(а)пирен	"-	0,005	0,001	с.-т.	2
Ди(2-этилгексил)фталат	"-	6	0,1	с.-т.	2
Гексахлорбензол	"-	0,2	0,2	с.-т.	2
Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мкг/л	0,5	0,2	с.-т.	1
2,4-Д	"-	1	1	с.-т.	2
Гептахлор	"-	0,05	0,05	с.-т.	2
ДДТ (сумма изомеров)	"-	0,5	0,5	с.-т.	2
Атразин	"-	0,2	0,2	с.-т.	2
Симазин	"-	0,2	0,2	орг.	4
II е. Комплексные показатели токсичности (подпункт в редакции Изменения N 2 от 28 июня 2010 года - см. предыдущую редакцию .)					
По \sum NO ₂ и NO ₃	единицы	≤ 1	≤ 1	-	-
По \sum тригалометанов	единицы	≤ 1	≤ 1	-	-

Примечание:

** - Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм.

¹ - Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

² - Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года) *Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02* обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

3) комплексные показатели по сумме $NO_2 + NO_3$ и сумме тригалометанов рассчитываются по формуле:

$$\Sigma = \frac{C_1}{ПДК_1} + \frac{C_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{C_B}{ПДК_B},$$

где:

C - содержание в воде, расфасованной в емкости, конкретного вещества в мг (мкг)/л;

ПДК - предельно допустимая концентрация этого вещества в воде, расфасованной в емкости, с учетом ее категории в мг (мкг)/л.

(Примечание дополнительно включено [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#))

4) выполняется анализ хлора остаточного (свободного и связанного), тригалометанов (хлороформ, бромформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) и четыреххлористого углерода только в расфасованной воде, источником которой является питьевая вода из централизованных систем питьевого водоснабжения (примечание дополнительно включено [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#)).

5) для газированных вод допускается снижение водородного показателя (рН) не ниже 4,5 единицы (примечание дополнительно включено [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#)).

4.4.6. Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в настоящем СанПиНе, не должно превышать установленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

4.5. Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в [таблице 3](#) .

Таблица 3

Показатели	Единицы измерения	Показатели радиационной безопасности	
		первая категория	высшая категория
Суммарные показатели ¹			
Удельная суммарная α - активность	Бк/кг	0,2	0,2
Удельная суммарная β -активность	Бк/кг	1,0	1,0
Радионуклиды ²			
Радон (^{222}Rn) ³	Бк/кг	60	60
Σ радионуклидов ³	единицы	$\leq 1,0$	$\leq 1,0$

Примечания:

¹ При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

² Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с санитарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

³ При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие $\sum (A_i / УВ_i) \leq 1$, где A_i - удельная активность i-го радионуклида в воде; $УВ_i$ - соответствующий уровень вмешательства согласно [приложению 2а к СанПиН 2.6.1.2523-09* "Нормы радиационной безопасности \(НРБ-99/2009\)"](#). При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством".

* Зарегистрированы Минюстом России 14.08.2009, регистрационный номер 14534.

(Пункт 4.5 в редакции, введенной в действие с 1 мая 2010 года [Изменением N 1 от 25 февраля 2010 года](#) . - См. [предыдущую редакцию](#))

4.5.1. Пункт исключен с 1 мая 2010 года [Изменением N 1 от 25 февраля 2010 года](#) . - См. [предыдущую редакцию](#) .

4.6. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в [таблице 4](#) .

Таблица 4

Показатели	Единицы измерения	Нормативы качества расфасованных вод	
		Первая категория	Высшая категория
IV а. Бактериологические показатели:			
ОМЧ при температуре 37 °С ОМЧ при температуре 22 °С	КОЕ/мл	не более 20 не более 100	не более 20 не более 100
Общие колиформные бактерии	КОЕ/ 100 мл	отсутствие в 300 мл	отсутствие в 300 мл
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/ 100 мл	отсутствие в 300 мл	отсутствие в 300 мл
Глюкозоположительные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	отсутствие в 300 мл	отсутствие в 300 мл
Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/ 100 мл	отсутствие в 20 мл	отсутствие в 20 мл
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		отсутствие в 1000 мл	отсутствие в 1000 мл
IV б. Вирусологические показатели:			
Колифаги	БОЕ/ 100 мл	отсутствие в 1000 мл	отсутствие в 1000 мл
IV в. Паразитарные показатели:			
Ооцисты криптоспоридий	кол-во/50л	отсутствие	отсутствие

Цисты лямблий	-"	отсутствие	отсутствие
Яйца гельминтов	-"	отсутствие	отсутствие

4.7. Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в табл. 5.

Таблица 5

Показатели	Единицы измерения	Нормативы физиологической полноценности питьевой воды, в пределах	Нормативы качества расфасованных вод	
			Первая категория	Высшая категория
Общая минерализация (сухой остаток), в пределах	мг/л	100-1000	1000	200-500
Жесткость	мг-экв/л	1,5-7	7	1,5-7
Щелочность	-"	0,5-6,5	6,5	0,5-6,5
Кальций (Ca)	мг/л	25-130*	130	25-80
Магний (Mg)	-"	5-65*	65	5-50
Калий (K)	-"	-	20	2-20
Бикарбонаты (НСО ₃)	-"	30-400	400	30-400
Фторид-ион (F)	-"	0,5-1,5	1,5	0,6-1,2
Иодид-ион (J)	мкг/л	10-125	125**	40-60***

Примечания:

* - расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/л и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция, и наоборот;

** - йодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йоддефицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йодид-иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм;

*** - йодирование воды на уровне 40-60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики (абзац в редакции [Изменения N 2 от 28 июня 2010 года](#) - см. [предыдущую редакцию](#)).

4.9*. Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- 5 мг/л - для воды первой категории;

- 9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при t - 20-22°) - для воды высшей категории.

Расфасованные воды с содержанием кислорода выше 15 мг/л должны проходить санитарно-токсикологическую оценку безопасности (абзац дополнительно включен [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#)).

4.10. В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, указанные в [таблице 6](#).

Таблица 6

Консерванты	Единицы измерения	Предельно допустимая концентрация в питьевой воде	Нормативы качества расфасованных вод, не более	
			Первая категория	Высшая категория
Серебро (Ag)	мг/л	0,05	0,025	0,0025
Иод (J)	-"	0,125	0,06	0,06
Диоксид углерода (CO ₂)	%	0,4*	0,4	0,2

Примечание: * максимально допустимая массовая доля диоксида углерода в соответствии с государственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

4.11. Расфасованная вода для приготовления детского питания (при искусственном вскармливании детей) должна соответствовать нормативным величинам по основным показателям воды высшей категории, а также следующим дополнительным требованиям:

- а) не допускается использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов;
- б) содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6-1,0 мг/л;
- в) содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04-0,06 мг/л¹.

¹ Допускается не проводить кондиционирование по йоду расфасованной воды для приготовления детского питания.

(Пункт в редакции [Изменения N 2 от 28 июня 2010 года](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

4.12. Вода питьевая должна быть разлита в потребительскую тару, разрешенную в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами (пункт дополнительно включен [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#)).

4.13. Маркировка расфасованной воды должна содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства.

Маркировка расфасованной воды, предназначенной для детского питания, должна содержать информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки.

(Пункт дополнительно включен [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#))

4.14. Условия хранения и транспортировки расфасованной воды должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации изготовителя на готовую продукцию, утвержденную в установленном порядке (пункт дополнительно включен [Изменением N 2 от 28 июня 2010 года](#)).

V. Производственный контроль качества расфасованных питьевых вод

5.1. Изготовители, осуществляющие производство расфасованных вод, обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года) *Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02*
санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

- обеспечивать безопасность для здоровья человека расфасованных вод при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.

5.2. На основании требований настоящих санитарных правил изготовители до начала осуществления производства расфасованных вод разрабатывают рабочую программу производственного контроля (далее - рабочая программа). Рабочая программа согласовывается Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории на срок 3 года и утверждается изготовителем.

5.3. Объектами производственного контроля являются: вода водоисточника, вода на этапах водоподготовки, вода перед розливом, емкости и укупорочные средства, готовая продукция.

5.4. Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, качества готовой продукции.

5.5. Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотипных емкостях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое на склад по одному документу о качестве).

5.6. Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены сокращенный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.

5.7. Органолептический и микробиологический контроль расфасованной воды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа водоподготовки.

5.8. Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при сокращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в месяц) анализах устанавливают с учетом требований, указанных в [приложении](#).

5.9. Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

5.10. Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о результатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.

5.11. Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на производстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;
- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека;
- информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

VI. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством расфасованных вод

6.1. Надзор за организацией и проведением производственного контроля является составной частью государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством расфасованных вод, осуществляемого органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6.2. Территориальный центр госсанэпиднадзора выдает санитарно-эпидемиологическое

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года)
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12
 СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02

заключение на источники водоснабжения, проекты предприятий по производству расфасованных вод, согласовывает рабочие программы производственного контроля; в порядке государственного надзора осуществляет выборочный лабораторный контроль, проверяет ведение документации, регистрирует результаты анализов по согласованным точкам и показателям, технологические параметры обеззараживания, консервирования и т.д.

6.3. При изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в районе водозаборов и местах расположения организаций центр госсанэпиднадзора информирует об этом руководителя организации, осуществляющей производство расфасованных вод, с целью корректировки рабочих программ (увеличение частоты отбора проб, расширение спектра контролируемых показателей).

Приложение
 к СанПиН 2.1.4.1116-02

Показатели производственного контроля при сокращенном и периодическом анализе

Наименование показателя	Вид анализа	
	Сокращенный (в каждой партии)	Сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц)
1	2	3
<u>Органолептические:</u>		
- запах при 20°C	+	
- при нагревании до 60°C	+	+
- привкус	+	
- водородный показатель	+	
- цветность		+
- мутность		+
<u>Бактериологические:</u>		
ОМЧ при температуре 37° С	+	
ОМЧ при температуре 22° С		+
Общие колиформные бактерии	+	
Глюкозоположительные колиформные бактерии	+	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		+
<u>Показатели органического загрязнения:</u>		
Окисляемость перманганатная		+
<u>Содержание реагентов:</u>		
озон	+	
серебро	+	

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (с изменениями на 28 июня 2010 года)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12
СанПиН от 15.03.2002 N 2.1.4.1116-02

йодид-ион	+	
фторид-ион	+	
диоксид-углерода	+	

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

[О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" \(с изменениями на 28 июня 2010 года\) \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)